

☀ Coup de chaud annoncé cette semaine ! ☀



Repousse de prairie derrière foin en bio en Indre-et-Loire (photo du 12 juin)

Une pousse de l'herbe toujours au ralenti : On observe sur la région des pousses de 0 à 32 kg de MS/ha/jour avec une moyenne de 17 Kg MS/ha/j sur les prairies permanentes et de 27 kg MS/ha/jour sur les prairies temporaires. La situation reste très hétérogène sur la région. Dans les situations les plus tendues, le pâturage des paddocks se fait en accéléré pour éviter de surpâturer et pénaliser les repousses. L'intégration des repousses des 1ères coupes se fait quant à elle avec le même souci de préservation de la flore afin d'allonger la période de pâturage.

Des deuxièmes coupes de luzerne (voire bientôt les 3èmes dans le cas d'une 1ère coupe fin avril) qui sont au bon stade pour une nouvelle récolte. Objectif : concilier volume et qualité compte tenu des conditions climatiques annoncées.



La semaine chaude qui s'annonce doit nous amener à porter une attention plus particulière sur l'abreuvement des animaux.

Cela concerne surtout les troupeaux qui restent au pâturage. Les consommations d'un couple mère veau pourraient atteindre 100 litres d'eau par jour soit près de 2 500 l par jour pour un lot de 25 vaches. La capacité de l'abreuvoir doit permettre à 20 % du lot de boire en même temps quand celui-ci est situé à plus de 200 m du bout de la parcelle. Le débit doit être suffisant pour permettre à la moitié du troupeau de s'abreuver en 10 minutes.

Dans le cas du pâturage tournant en paddocks, où l'abreuvoir est à moins de 200 m de la zone pâturée, il suffit que 10 % du lot puisse s'abreuver en même temps et que le débit fournisse 25 % du besoin quotidien en 10 minutes.

Quelle que soit l'espèce animale, la consommation d'eau double au-delà de 30°C. L'été, cela représente 5 litres par jour et par brebis soit 1000 litres pour un lot de 200 brebis.

Pour les animaux laitiers en bâtiments, les besoins en eau vont aussi être plus élevés avec l'élévation des températures (160 l/j pour des vaches laitières à 30 l en ration ensilage l'été contre 80 l/j l'hiver à 15 °C).



Abreuvoir pour paddocks en pâturage tournant en bovins viande pour des lots compris entre 20 et 30 animaux (Indre-et-Loire)

Nos conseils par filière

Bovin Lait	La fin du pâturage s'annonce dans les secteurs où les animaux consommaient encore 10 % de leur ration à l'herbe.
Bovin Viande	Statu quo dans les prairies avec peu de pousse. Poursuivre le pâturage avec des temps de retour de 30 à 40 jours.
Caprin	Les luzernes devraient passer le coup de chaud de la semaine sans trop de soucis. L'affouragement pourra continuer.
Ovin	Les repousses après les foins tardifs de cette semaine vont permettre de continuer le pâturage tournant.
Equin	N'ayez plus d'appréhension à faire pâturer vos chevaux à 100% compte tenu de la qualité de l'herbe.