

☀ Surveillez vos maïs et faites le point sur vos stocks ☀

Ferme Expérimentale des Bordes (36)

Visite de la plateforme sur "l'Adaptation au changement climatique" en 2ème année, le 24 Juillet de 14h à 17h30.



CA36 Cultures à venir 3ème édition

"Mettez vous au vert luzerne !"

Le 9 septembre 13h30 à Martizay



AGENDA

La baisse de pousse de l'herbe se poursuit (de 9kg à 14kg de MS/ha/j sur PP et autour de 20 kg pour les PT la semaine passée).

De nombreux troupeaux sont repassés en ration hivernale il semble donc important de **faire le point sur vos stocks**. D'autant plus que, comme indiqué la semaine dernière, dans bien des cas la paille ne pourra assurer le complément nécessaire pour l'alimentation en raison des faibles rendements.

Dans un **système tout herbe avec du pâturage** vous devez avoir aujourd'hui en stock à **peu près 100% de vos besoins** c'est-à-dire :

- en bovin lait 4.5 TMS/vache
- en bovin viande 2.2 à 2.4 TMS/vache
- en ovin viande 0.75 à 0.9 TMS/brebis
- en caprin 0.9 à 1,1 TMS/chèvre.


Suivi du pâturage : nous entamons la pleine période de pâturage estival, le maître mot reste de **ne pas épuiser ses prairies !**

De manière générale en été, la surface nécessaire pour le pâturage est le double de celle du printemps. Le temps de retour sur une même parcelle doit également être allongé et ne sera pas inférieur à 40j.

Si la surface disponible n'est pas suffisante durant l'été, veillez à ne pas surpâturer toutes les parcelles. Choisissez plutôt d'affourager les animaux sur une parcelle « parking », qui présente un faible potentiel ou qui est à refaire.

Suivi du maïs : de nombreux maïs implantés début avril sont déjà au **stade floraison femelle** c'est-à-dire sortie des soies.

On estime qu'une parcelle est fleurie lorsque 50% des plantes ont des soies. Ce stade est **primordial à repérer**, car à compter de celui-ci, 550 à 700 degrés jours (base 6) seront nécessaires, suivant la précocité, pour atteindre le stade optimal de récolte en ensilage à 32% de MS. Au vu des prévisions météo des prochaines semaines sur la Région, les estimations de dates de récolte en ensilage sont autour du 15 août pour les plus précoces.



Floraison d'un maïs indice 290/300 semés le 8 Avril à Fondettes (37) le 07/07/20

Nos conseils par filière

Bovin Lait	Ration 100% stock maintenue dans la plupart des secteurs.
Bovin Viande	Le pâturage se poursuit même si certains troupeaux commencent à affourager.
Caprin	Des secondes ou troisièmes coupes de foin ont été réalisées la semaine dernière et d'autres seront encore effectuées cette semaine. L'affouragement en vert sur luzerne se poursuit sans difficultés.
Ovin	Le pâturage des parcelles de regain se termine plus ou moins rapidement en fonction de la date des foins.
Equin	Faites le point sur vos stocks de fourrages pour pouvoir anticiper des besoins supplémentaires avec vos fournisseurs. Pour le foin comptez 10kg/j/cheval et 5kg/j/poney sur les périodes où aucun pâturage n'est possible.